Observe bien chaque animal en lisant les informations données, puis remplis le tableau suivant en précisant par une croix les caractères que chaque animal possède.

Nom de l'animal	Bouche avec mâchoires	Squelette interne (os)	4 membres	Peau nue	Peau avec poils	Peau avec plumes	Peau qui mue
musaraigne							
margouillat							
Gecko vert							
Petit molosse							
grenouille							
papangue							

Grâce à ce tableau, classe les 6 animaux proposés en construisant des groupes emboités, comme dans la classification actuelle des animaux Vertébrés étudiée.

Observe bien chaque animal en lisant les informations données, puis remplis le tableau suivant en précisant par une croix les caractères que chaque animal possède.

Nom de l'animal	Bouche avec mâchoires	Squelette interne (os)	4 membres	Peau nue	Peau avec poils	Peau avec plumes	Peau qui mue
musaraigne							
margouillat							
Gecko vert							
Petit molosse							
grenouille							
papangue							

Grâce à ce tableau, classe les 6 animaux proposés en construisant des groupes emboités, comme dans la classification actuelle des animaux Vertébrés étudiée.

Observe bien chaque animal en lisant les informations données, puis remplis le tableau suivant en précisant par une croix les caractères que chaque animal possède.

Nom de l'animal	Bouche avec mâchoires	Squelette interne (os)	4 membres	Peau nue	Peau avec poils	Peau avec plumes	Peau qui mue
musaraigne							
margouillat							
Gecko vert							
Petit molosse							
grenouille							
papangue							

Grâce à ce tableau, classe les 6 animaux proposés en construisant des groupes emboités, comme dans la classification actuelle des animaux Vertébrés étudiée.

(124) MUSARAIGNE MUSQUÉE *Suncus murinus* (Introduite)

Cr. : Ra miské. Fr. : Musaraigne des maisons. Angl. : Indian House Shrew. Esp. : Musaranita de India.

Identification : 16 cm ; insectivore de la famille des Soricidae au pelage uni généralement gris, parfois brun légèrement plus clair au-dessous ; museau allongé ; queue courte ; odeur musquée. **Indices de présence :** petit cri d'alarme incisif, bref et puissant. **Remarques :** espèce introduite déjà connue sur l'île en 1730, originaire d'Asie tropicale et répandue dans tous les milieux du littoral à plus de 2 500 mètres d'altitude. La Musaraigne musquée a été introduite dans de nombreuses îles de l'océan Indien.

Musaraigne musquée

(163) MARGOUILLAT BLANC
***Gehyra mutilata* (Introduit)**

Cr. : Margouya, Lézar blan. Fr. : Gecko Blanc. Angl. : House Gecko.

Identification : 11 cm ; le plus grand des geckos nocturnes ; corps massif de couleur variable, apparaissant rosée ou jaunâtre la nuit et brun-sombre plus ou moins ponctué de taches claires le jour ; queue plate en dessous et légèrement pincée à la base. **Indices de présence :** genre de petit rire « guek guek guek ». **Remarques :** espèce introduite du sud de l'Asie (région indo-chinoise, Myanmar, Thaïlande) ; déjà mentionée par Bory de Saint-Vincent qui parcourut l'île en 1801 ; c'est le gecko nocturne le plus répandu dans les maisons ; observé dès la tombée de la nuit, souvent près des sources lumineuses, courant le long des murs ou aux plafonds, à la recherche de petits insectes et de papillons nocturnes ; présent à Maurice, Rodrigues, Madagascar, Sri Lanka et aux Seychelles.

Margouillat blanc

(169) GECKO VERT A TROIS TACHES ROUGES *Phelsuma laticauda* (Introduit)

Cr. : Lézar ver, Lézar malgas. Angl. : Gold dust day gecko.

Identification : 10,5-13 cm ; gecko diurne vert, souvent comme saupoudré de jaune d'or, avec trois bandes rouges interrompues au niveau du bas du dos ; large queue vert-jaune. **Indices de présence :** cris « tac tac ». **Remarques :** gecko introduit à Grand-Fond en 1975 ; groupes localisés de Saint-Gilles-les-Bains jusqu'à La Saline-les-Bains ; également présent aux Comores et à Farquhar.



Gecko vert à trois taches rouges

Petit molosse

(129) PETIT MOLOSSE
***Mormopterus acetabulosus* (Protégé)**

Cr. : Sosuri. Angl. : Mascarene Free-tailed Bat All. : Faltlippen Fledermaüse. Esp. : Murcielago.

Identification : 7 cm ; petite chauve-souris de la famille des Molossidae ; pelage brun foncé ; petite oreille noire avec un tragus fin et pointu ; avant-bras mesurant de 36 à 38,5 mm ; odeur musquée caractéristique ; la queue dépasse de la membrane de plus de 1,5 cm. **Émission sonore :** cliquetis d'une fréquence de 20 à 65 kHz ; petits cris audibles rapides, se terminant en trille lors du vol de chasse. **Remarques :** espèce indigène commune à La Réunion et à l'île Maurice, notée également en Afrique du Sud et en Éthiopie ; présente du littoral jusqu'à 1 800 m d'altitude. Elle fréquente la plupart des ravines, et s'abrite soit dans les grottes, soit au fond des fissures des rochers ; également dans les constructions humaines, sous les toits des habitations et les fissures des ponts.

(177) GRENOUILLE *Ptychadena mascareniensis* (Introduite)

Angl. : Malagasy Frog.

Identification : 3-5,5 cm ; grenouille de la famille des Ranidae ; petite taille ; dessus du corps généralement brun-clair, vert ou bicolore, avec des taches brun-sombre jusque sur les pattes ; ligne vertébrale jaune ou brun-clair ; dessous blanc à jaune-clair ; mâle plus petit, et muni de sacs vocaux latéraux. **Indices de présence :** trille de notes aiguës et métalliques « krek krek krek » (fréquence dominante : 0,5 à 3 kHz). **Remarques :** espèce introduite vers 1750, originaire de Madagascar, commune autour des étangs et au fond des ravines humides toute l'année ; se rencontre également à Maurice et aux Seychelles.

Grenouille

Papangue femelle

(40) PAPANGUE *Circus maillardi* (Protégé)

Cr. : Papang. Fr. : Busard de Maillard. Angl. : Reunion Harrier. All. : Reunionweiher. Esp. : Aguilla de Reunion.

Identification : 50 cm ; famille des Accipitridae ; rapace de taille moyenne ; mâle reconnaissable à son plumage brun-strié alterné de blanc-grisâtre et le bout des ailes noires ; femelle brune avec une tache blanche au croupion ; c'est le plus grand oiseau nicheur de La Réunion. **Voix :** cri plaintif isolé « kièè » ou série de cris sonores « kiè ké-ké ».